

# 細則を読む：ワクチンのパッケージ挿入物は何百もの医療を明らかにする ワクチンに関連する条件



子どもの健康防衛チームによる

私

国立衛生研究所の高官

「Fauci博士は2015年8月FDAの医師Fauci博士に会った」

Poobah—PBSを語った 最前線 ワクチンのリスクは「ほとんど測定不可能。」Fauciは次に、面接官によって提案されたすべての潜在的なワクチンリスクを軽視し、それぞれに「実際には根拠がない」と述べました。1984年以来、国立アレルギー感染症研究所（NIAID）の理事を務めてきたFauciは、当時1980年代後半に設立された全国ワクチン傷害補償プログラムがワクチンで負傷した：

43億ドル 2020年4月1日現在。フォーキ氏は2010年のハーバード大学の調査で1未満 ワクチンの有害事象の%が報告されます。報告されていないものは測定できません。

すべての添付文書（FDAとワクチン会社の両方がオンラインで入手可能）には、「米国およびその他の国で自発的に報告された」有害事象をリストした市販後の経験（セクション6.2）に関するセクションが含まれています

ワクチンの免許取得後。

ワクチンは、生物製剤と呼ばれる医薬品のクラスに属し、アレルギー専門家が使用する製品

広く認める「引き起こす可能性のために アレルギー性過敏反応」などの悪影響があります。Fauci博士（アレルギーと免疫学に重点を置いた施設の責任者）は、少なくとも22種類のワクチンの添付文書にアレルギー性過敏反応が有害事象として記載されていることを認識していません。

少なくとも31種類のワクチンの添付文書には、ワクチン後のアナフィラキシー反応が記載されているのですか？

実際のところ、ワクチンの添付文書は、消費者が公式の妨害を回避し、子供や青年に与えられたワクチンについて報告された200を超える有害事象について知りたいときに利用できる詳細情報の入手可能な数少ない情報源の1つです。すべての添付文書（FDAとワクチン会社の両方からオンラインで入手可能）には、ワクチンの認可後に「米国およびその他の国で自発的に報告された」有害事象をリストした市販後の経験（セクション6.2）に関するセクションが含まれています。製造業者は上のリストに有害事象を含みますの基礎重症度、報告頻度、ワクチンとの因果関係の証拠の強さ。また、ワクチンの臨床試験中に検出されなかった可能性のある有害事象も含まれます。

...13の病気の予防のために促進されたワクチンは、少なくとも217の有害な医学的転帰の市販後報告をもたらしました、

死を含む。

### 細かい文字に光を当てる

添付文書の細かい部分に埋め込まれた情報の親の使用を促進するために、Children's Health Defenseは、米国の小児および青年期のワクチンスケジュールに現在含まれているすべてのワクチンについて、セクション6.2で報告された有害事象の包括的なレビューを実施しました。レビューには、ジフテリアから保護するために8つの異なるメーカーが製造した38のワクチンブランドが含まれています。

ヘモフィルスインフルエンザeタイプb、A型肝炎、B型肝炎、ヒトパピローマウイルス、インフルエンザ、髄膜炎菌感染症、百日咳、肺炎球菌感染、ポリオ、ロタウイルス、破傷風、水痘（表1）。挿入物から編集された情報によると、これらのワクチンは13の病気の予防のために宣伝されており、市販後の

の報告 **死亡を含む少なくとも217件の医学的転帰**（表2）。

表2に示されている情報についていくつか注意する点があります。最初に、各障害に対して逐語的な挿入の用語を使用し、また添付文書の疾患の分類にもほとんどこだわっていましたが、アレルギーと自己免疫障害という2つのカテゴリを追加しました。インサートは驚くほど省略されています。（

パッケージには、「免疫系障害」を伴うアレルギー反応が含まれています。2番目に、複数のカテゴリに当てはまる障害がいくつかあります。それらの例では、それらを（アスタリスク\*を付けて）両方の場所に含めました（それらを1回カウントしている間）。第3に、表には製造元が挿入物で報告することを決定した有害事象のみが含まれていますが、他の有害事象は可能性があるだけでなく、おそらく、過少報告の広範な問題が原因です。特に、添付文書には、出版された査読済みの研究がワクチンに関連している、チックや自閉症などの一般的な小児期発症の神経発達障害についての言及は含まれていません。

...Pentacelワクチン（Hib成分を含む）は「侵襲性Hib疾患」を引き起こす可能性があります。  
RotaTeqワクチン（ロタウイルス用）は、「ワクチン未接種者へのワクチンウイルス株の感染」に関連しています。そして、いくつかのインフルエンザ

ワクチンはインフルエンザを引き起こします。

### テーマ

読者が表2を熟読すると、次のテーマに気付く場合があります。

- ◆ **小児/思春期のワクチンのスケジュールにあるすべてのワクチンは、少なくとも1つの責任があります**  
**有害事象。** たとえば、すでに述べたように、5つのワクチンのうち約4つ（82%）がアナフィラキシー反応の報告に関連しています。アナフィラキシーの発生率は、米国で数十年にわたって上昇しています。薬物はアナフィラキシーの最もよく知られたトリガーであり、アナフィラキシー症例の別の39%は特発性、原因が「不明」であることを意味します。
- ◆ **ワクチンは非常に病気を引き起こす可能性があります** —または  
それらの病気の悪影響-彼らが予防することになっているもの。麻疹の誇大宣伝とヒステリーの時代には、MMR-IIとProQuadの両方のMMRワクチンがワクチンであると指摘することが特に重要でした。  
防げない「非定型はしか」（両方のワクチン）、「はしか」（ProQuad）、「はしかのような発疹」（MMR-II）、「皮膚感染症」（ProQuad）。同様に、パッケージには、VarivaxとProQuad（水痘とMMRを組み合わせた）によるワクチン接種の結果として、「水痘」と「水痘のような発疹」が挿入されています。同様に、MMR-IIおよびProQuadワクチンは、

おたふく風邪は、無事な子供の頃の病気から 生殖能力を脅かす 青年および成人を苦しめる状態—深刻な精巣の問題の報告を作成しました ( 精巣上体炎 そして 精巣炎 )。表2は、Pentacelワクチン ( Hib成分を含む ) が「侵襲性Hib疾患」を引き起こす可能性があることも示しています。RotaTeqワクチン ( ロタウイルス用 ) は、「ワクチン未接種者へのワクチンウイルス株の感染」に関連しています。そして、いくつかのインフルエンザワクチンはインフルエンザを引き起こします。

❖ ワクチンはまた、他の深刻な感染症を引き起こす可能性があります。

たとえば、危険なMMR-II、ProQuad、およびVarivaxトリオは「肺炎」および「肺うつ血」に関連付けられています。InfanrixおよびPediarixワクチンは「気道感染症」に関連付けられており、7つの異なるワクチンはさまざまな形態の髄膜炎に関連付けられています。皮肉なことに ( あるいはそうでないかもしれませんが )、肺炎および髄膜炎は、肺炎球菌および髄膜炎菌ワクチンの標的である。

❖ ワクチンの有害事象は多くの身体に影響を与える

**システム**、免疫系や神経系を含みます。悪影響の最も長いリスト-41は神経系への影響に関するものですが、広範囲にわたるリストには、血液、結合組織、耳、目、胃腸系、心臓、肝臓、リンパ節、筋骨格系への影響も示されています。呼吸器系、皮膚など。

**ファウチ博士自身、コロナウイルスワクチンの開発を急いでいるジョンソン&ジョンソンのような企業が、子供と高齢者を深刻な側面にさらしたドラッグマーケティング詐欺で司法省に非難されているという事実**に注意したいと思うかもしれません。効果、

**死を含む。**

**測定可能で安全でないことが多い**

すべての医薬品には可能性がありますが

副作用、そしてワクチンも例外ではありません。Fauci博士は、ワクチンに関連する有害事象を「ほとんど測定不能」と説明します。それらは添付文書に記載されているだけでなく、

市販後監視システム 米国のワクチン有害事象報告システム ( VAERS )、ヨーロッパ オイドラビジランス システムと世界保健機関の VigiBase システム—不誠実であるだけでなく、非倫理的で、フォーチ博士の妻が **シニアNIH生命倫理学者**、ワクチンの有害事象の有病率と重要性を軽視するためのNIAIDディレクターの倫理的に曖昧な熱意は驚くべきことです。

COVID-19の状況により、Fauciは「チーフ説明者」の流行の—そして主任の支持者 **特許可能なワクチン** これは、通常のワクチン開発プロトコルを飛び越えて**未検証の技術**を使用することになります。ワクチンの安全性に関するFauciの5歳の使い捨ての発言に疑問を投げかけることはできません。Fauci博士自身は、Johnson & Johnsonのような企業が コロナウイルスワクチンの開発を急いでいる人の一人、司法省により非難されたドラッグマーケティング詐欺 子供や高齢者を「死を含む深刻な副作用」にさらした。\_\_\_\_\_

多くは作られています **フォーチ**、**NIAIDの** **そしてその NIH** \_\_\_\_\_  
ビルゲイツ、ビル&メリンダゲイツ財団、ゲイツ財団が創設した疫病対策イノベーション連合 ( CEPI ) との居心地の良い絡み合い **ゲイツ財団** \_\_\_\_\_

そして **CEPI NIH**もサポートしているコロナウイルスワクチンに向けた資金。ゲイツは最近**デジタル 証明書** 最終的なコロナウイルスワクチンを受け取った人を示し、「世界中の人々が移動することを望んでいない」というペールに包まれた声明も発表しました **でなければ** 彼らはワクチンを受けた。その文脈では、2015年のFauciの追加の発言 **最前線** \_\_\_\_\_

インタビューはやや不吉な含みを帯びています。良い医者、「誰かがあなたを縛り付けて、あなたに予防接種をする状況は決してありません。。。人々の自主性を尊重したくない 妨げになる 公衆衛生上の義務の。」 \_\_\_\_\_

表1.レビューされたワクチンの添付文書

ワクチンの種類	ブランド名	メーカー
ジフテリア、破傷風、百日咳の成分を含むワクチン	アダセル ( Tdap ) ブーストリックス ( Tdap ) ダブタセル ( DTaP ) 吸着したジフテリアおよび破傷風トキソイド ( DT ) Infanrix ( DTaP ) キンリックス ( DTaP-IPV ) Pediarix ( DTaP-HepB-IPV ) ペンタセル ( DTaP-IPV / Hib ) Quadracel ( DTaP-IPV ) Tdvax ( Td ) テニバック ( Td )	サノフィバシール GlaxoSmithKline ( GSK ) サノフィ サノフィ GSK GSK GSK サノフィ サノフィ MassBiologics サノフィ
インフルエンザ菌タイプBワクチン	ActHIB ( Hib ) Hiberix ( Hib ) PedvaxHIB ( Hib )	サノフィ GSK メルク
肝炎ワクチン	Engerix-B ( HepB ) Havrix ( HepA ) Recombivax HB ( HepB ) Twinrix ( HepA / HepB ) バクタ ( HepA )	GSK GSK メルク GSK メルク
ヒトパピローマウイルス ( HPV ) ワクチンインフルエンザワクチン	ガーダシル ガーダシル9	メルク メルク
	Afluria Quadrivalent Fluarix Flublok Quadrivalent ( 18歳 およびそれ以上 ) フルセルバックス フルラバル四価 インフルエンザミスト Fluzone Quadrivalent	セキラス GSK タンパク質科学 株式会社 セキラス GSK アストラゼネカ サノフィ
髄膜炎菌ワクチン	ベクセロ トルメンバ	GSK ファイザー
はしか-おたふく風邪-風疹 ( MMR ) と MMR +水痘ワクチン	MMR-II ( MMR ) ブロクアッド ( MMRV )	メルク メルク
肺炎球菌ワクチン	Prevnar-13 ニューモバックス-23	ファイザー メルク
不活化ポリオワクチン ( IPV ) ロタウイルス スワクチン	IPOL ( IPV ) Rotarix RotaTeq	サノフィ GSK メルク
水痘ワクチン	Varivax	メルク

表2.添付文書で報告された有害事象（身体系別）\*

[注：アスタリスクのある病状は、複数のカテゴリに表示されます。]

ボディシステム	医学的障害	障害を報告するワクチン
アレルギー（5）	アレルギー反応/過敏症*	ActHIB、Adacel、Afluria、Bexero、Boostrix、Daptacel、Engerix-B、Fluarix、Flublok、FluMist、Fluzone、Hiberix、Infanrix、IPOL、Kinrix、Pediarix、Pentacel、Quadracel、Recombivax、Tenivac、Trumenba、Twinrix
	アナフィラキシーとアナフィラキシー様ショックを含む反応*	ActHIB、Adacel、Afluria、Bexero、Boostrix、Daptacel、Engerix-B、Fluarix、Flublok、Flucelvax、Fluval、FluMist、Fluzone、Havrix、Hiberix、Infanrix、IPOL、Kinrix、MMR-II、Pediarix、Pentacel、Pneumovax Pevnar-13、ProQuad、Quadracel、Recombivax、RotaTeg、Tenivac、Trumenba、Twinrix、Varivax
	血管浮腫*	ActHIB、Adacel、Boostrix、Daptacel、Engerix-B、Fluarix、Flucelvax、Fluval、FluMist、Fluzone、Havrix、Hiberix、Infanrix、Kinrix、MMR-II、Pediarix、PedvaxHIB、Pneumovax-23、Pevnar-13T、ProQuad、Rota Tenivac、Twinrix、Varivax
	血清病*	Afluria、Engerix-B、Fluarix、Havrix、Pneumovax-23、Recombivax、Twinrix
	じんましん* [じんましん]	ActHIB、Adacel、Afluria、Boostrix、DT、Engerix-B、Fluarix、Flucelvax、Fluval、FluMist、Fluzone、Hiberix、Infanrix、IPOL、Kinrix、MMR-II、Pediarix、Pentacel、Pneumovax-23、Pevnar-13、Quadracel、Recombivax、RotaTeg、Tenivac、Twinrix
自己免疫（7）	糖尿病*	MMR-II
	ギランバレー症候群*	Adacel、Afluria、Engerix-B、Fluarix、Fluval、FluMist、Fluzone、Havrix、MMR-II、PedvaxHIB、Pneumovax-23、ProQuad、Recombivax、Tenivac、Vaqta、Varivax
	川崎病* [血管疾患]	Rotarix、RotaTeg
	ループス様症候群*	Recombivax
	多発性硬化症（またはMS悪化）*	Engerix-B、Havrix、Recombivax、Twinrix
	膵炎*	Gardasil / Gardasil 9、MMR-II
	全身性エリテマトーデス*	Recombivax
血液/リンパシステム（10）	貧血、形成不全または溶血	Gardasil / Gardasil 9、Pneumovax-23、ProQuad、Varivax
	鼻血[鼻血]	FluMist、ProQuad
	溢出[血管漏出]	ブロックアット
	ヘマトヘジア[血便]	ProQuad、Rotarix、RotaTeg
	赤血球沈降速度の増加	Recombivax
	白血球増加症[白血球の増加]	MMR-II、Pneumovax-23
	リンパ節炎[リンパ節の腫れ]	Boostrix、Pneumovax-23、ProQuad
	地域を含むリンパ節腫脹	Boostrix、Daptacel、DT、Fluarix、Fluval、Fluzone、Gardasil / Gardasil 9、Infanrix、IPOL、Kinrix、MMR-II、PedvaxHIB、Pneumovax-23、Pevnar-13、ProQuad、Tenivac
	血小板減少症[低血小板]	Afluria、Engerix-B、Fluzone、Havrix、Infanrix、Kinrix、MMR-II、Pneumovax-23、ProQuad、Recombivax、Twinrix、Vaqta、Varivax
	血小板減少性紫斑病、特発性	Gardasil / Gardasil 9、Rotarix、Twinrix、Varivax

心臓 ( 6 )	チアノーゼ* [ 青みがかった変色、低酸素]	Daptacel, Hiberix, Infanrix, Pediarix, Pentacel, Prevnar-13, Quadracel
	低血圧	アダセル
	心筋炎 [ 心筋の炎症]	Adacel, Boostrix
	動悸	Engerix-B, Twinrix
	心膜炎 [ 心膜炎症]	インフルエンザミスト
	頻脈 [ 異常に高い心拍数]	Engerix-B, Fluarix, Recombivax, Twinrix
先天性 ( 1 )	先天異常	Havrix
死 ( 2 )	死	Gardasil / Gardasil 9, MMR-II, Rotarix, RotaTeg Infanrix
	乳幼児突然死症候群 ( SIDS ) 耳の痛み	
耳/迷宮 ( 5 )		Engerix-B, Infanrix, ProQuad, Twinrix MMR-II, P
	神経難聴	roQuad
	中耳炎	MMR-II
	耳鳴り	Engerix-B, Recombivax, Twinrix
	めまい	Engerix-B, Fluarix
目 ( 15 )	結膜炎	Engerix-B, Fluarix, MMR-II, Recombivax, Twinrix Fluarix, ProQ
	目の炎症	uad
	目の痛み	フルアリックス、フルラバル
	目の発赤	Fluarix
	目の腫れ	Bexero, Fluarix
	まぶたの腫れ	Fluarix, ProQuad
	角膜炎 [ 角膜炎症]	Engerix-B
	眼充血 [ 目の炎症]	フルゾン
	眼性麻痺* [ 神経損傷]	MMR-II, ProQuad
	視神経炎/神経障害、乳頭炎* [ 視神経の炎症]	Engerix-B, Fluzone, MMR-II, ProQuad, Recombivax, Twinrix
	羞明 [ 軽い不耐性]	フララバル
	網膜炎、壊死性 [ 炎症]	MMR-II, ProQuad, Varivax
	球後神経炎 [ 神経損傷]	MMR-II, ProQuad
	ぶどう膜炎 [ 目の炎症]	Recombivax
	視覚障害	Engerix-B, Recombivax, Twinrix
胃腸 ( 13 ) 腹痛、不快感		Fluarix, ProQuad
	カンジダ症*	ブロクアット
	便秘	Recombivax
	下痢	Daptacel, FluMist, MMR-II, Pediarix, Pentacel Engerix-B, T
	消化不良 [ 消化不良]	winrix
	嚥下障害 [ 嚥下困難]	フララバル
	胃腸炎	Rotarix, RotaTeg
	反復性/を含む腸重積症 致命的な	Rotarix, RotaTeg
	口の潰瘍	ブロクアット
	吐き気	Daptacel, DT, Fluarix, FluMist, Gardasil / Gardasil 9, MMR-II, Pneumovax-23, Tdvax
	肺炎*	Gardasil / Gardasil 9, MMR-II
	口、喉、舌の腫れ	Fluarix



	嘔吐	Flulaval, FluMist, Fluzone, Gardasil / Gardasil 9, MMR-II, Pediarix, Pentacel, Pneumovax-23, Tenivac
一般および 注射サイト ( 20 )	異常歩行	フララバル
	無関心	ブロクアット
	無力症[ 疲労、衰弱]	Fluarix, Flulaval, Fluzone, Gardasil / Gardasil 9, Infanrix, Pediarix, Tenivac
	体の痛み	Fluarix
	胸痛	Fluarix, Flulaval, Fluzone
	寒気	Fluarix, Gardasil / Gardasil 9, Havrix, Twinrix Pneumovax
	四肢の可動性の低下	-23
	暑い	Fluarix
	熱	MMR-II, Pneumovax-23
	注射された手足—広範囲の腫れ	ActHIB, Bexero, Hiberix
	注射部位膿瘍	Adacel, Daptacel, Fluarix, Flulaval, PedvaxHIB, Pentacel, Quadracel
	注射部位のあざ	アダセル, フララバル
	注射部位蜂巣炎	Afluria, Daptacel, Fluarix, Flulaval, Pediarix, Quadracel, Tenivac
	注射部位の反応 ( 腫れ、痛み、温かさ )	Adacel, Afluria, Bexero, Boostrix, Daptacel, DT, Engerix-B, Fluarix, Flucelva x, Flulaval, Havrix, Hiberix, Infanrix, IPOL, Kinrix, MMR-II, Pediarix, Pentac el, Pneumovax-23, Prevnar-13, ProQuad, Quadracel, Tdvax, Tenivac, Twinr ix
	注射部位の発疹	Daptacel, Flulaval, IPOL, Prevnar-13 Quadrace
	無気力	I
	沈滞	Gardasil / Gardasil 9, MMR-II, Pneumovax-23, Tdvax, Twinrix
	末梢性浮腫	ActHIB, MMR-II, Pneumovax-23, ProQuad, Tdvax, Tenivac, Varivax
	バイレクシア[ 熱]	Tdvax
	腫れ	MMR-II, ProQuad
肝胆/肝臓 ( 3 ) 肝臓酵素の上昇	肝炎	Recombivax
	黄疸	Havrix, Twinrix
	黄疸	Havrix, Twinrix
免疫システム ( 5 )	アレルギー反応/過敏症*	ActHIB, Adacel, Afluria, Bexero, Boostrix, Daptacel, Engerix-B, Flua rix, Flublok, FluMist, Fluzone, Hiberix, Infanrix, IPOL, Kinrix, Pedia rix, Pentacel, Quadracel, Recombivax, Tenivac, Trumenba, Twinrix
	アナフィラキシーとアナフィラキシー様 ショックを含む反応*	ActHIB, Adacel, Afluria, Bexero, Boostrix, Daptacel, Engerix-B, Fluarix, F lublok, Flucelvax, Flulaval, FluMist, Fluzone, Havrix, Hiberix, Infanrix, IPO L, Kinrix, MMR-II, Pediarix, Pentacel, Pneumovax Prevnar-13, ProQuad, Quadracel, Recombivax, RotaTeq, Tenivac, Trumenba, Twinrix, Varivax
	血管浮腫、*血管神経性浮腫	ActHIB, Adacel, Boostrix, Daptacel, Engerix-B, Fluarix, Flucelavx, Flulaval, F luMist, Fluzone, Havrix, Hiberix, Infanrix, Kinrix, MMR-II, Pediarix, PedvaxHIB 、Pneumovax-23, Prevnar-13T, ProQuad, Rota Tenivac, Twinrix, Varivax
	浮腫	アダセル
	血清病*	Afluria, Engerix-B, Fluarix, Havrix, Pneumovax-23, Recombivax, Twinrix

感染症と 蔓延 ( 29 )	非定型はしか	MMR-II、ProQuad
	気管支炎	Infanrix、ProQuad
	カンジダ症*	ブロクアット
	蜂巣炎	Daptacel、Infanrix、Pneumovax-23、ProQuad、Tdvax、Varivax PedvaxHIB
	早期発症型Hib疾患	
	単純ヘルペス	ブロクアット
	帯状疱疹[ 带状疱疹 ]	Engerix-B、ProQuad、Recombivax、Twinrix、Varivax ProQuad
	感染	
	インフルエンザ、インフルエンザ様疾患	Afluria、Fluulaval、Havrix、ProQuad Pentacel
	侵襲性Hib病	
	川崎病* [ 血管疾患 ]	Rotarix、RotaTeq
	喉頭炎	フララバル
	麻疹	ブロクアット
	麻疹のような発疹	MMR-II
	髄膜炎 ( 無菌、好酸球 )	Engerix-B、FluMist、MMR-II、Pentacel、ProQuad、Twinrix、Varivax
	咽頭炎	Fluarix、Varivax
	肺炎、肺炎	MMR-II、ProQuad、Varivax
	肺うっ血	ブロクアット
	気道感染症	Infanrix、Pediarix、ProQuad
	鼻炎	Fluarix、Fluulaval、Havrix、MMR-II、Pentacel、ProQuad
	二次細菌感染症 ( 皮膚、組織 ) 副鼻腔炎	Varivax
		ブロクアット
	皮膚感染症	ブロクアット
	喉の痛み	MMR-II、ProQuad
	扁桃腺炎	Fluarix
	ワクチンウイルス株Varicella ( ワクチン株 ) の感染	RotaTeq ProQuad、Varivax
	水痘様発疹	ブロクアット
	ウイルス感染	ペンタセル
調査 ( 2 )	異常な肝機能検査血清C反応性タンパク質の増加食欲低下	Engerix-B、Twinrix ニューモバックス-23
代謝 ( 3 )		ペンタセル
	糖尿病*	MMR-II
	ミトコンドリア脳筋症、リーシンドローム悪化[ 神経代謝 ]	インフルエンザミスト
筋骨格系/ 結合組織 ( 13 )	関節痛[ 関節痛 ]	Boostrix、Engerix-B、IPOL、MMR-II、Pneumovax-23、ProQuad、Recombivax、Tdvax、Twinrix
	関節炎	Engerix-B、Fluulaval、MMR-II、Pneumovax-23、ProQuad、Recombivax、Twinrix
	背中の痛み	ブーストリックス
	低血圧[ 低筋緊張 ]	Daptacel、Hiberix、Infanrix、Pediarix、Prevnar-13、Quadracel Recombivax
	ループス様症候群*	
	筋けいれん	アダセル
	筋力低下	Engerix-B、Fluulaval、Recombivax、Twinrix



	筋骨格痛	ブロックアッド
	筋骨格のこわばり	Havrix
	筋肉痛[ <i>筋肉痛</i> ]	Boostrix、IPOL、MMR-II、ProQuad、Tdvax、Tenivac Adacel
	筋炎[ <i>筋肉の炎症</i> ]	
	四肢の痛み	Fluarix、Fluzone、Pediarix、Recombivax、Tdvax、Tenivac Recombivax
	全身性エリテマトーデス*	
神経系 ( 41 ) 急性播種性脳	脊髄炎	MMR-II、ProQuad
	運動失調[ <i>神経系機能障害</i> ]	MMR-II、ProQuad、Varivax
	膨らみのあるフォントネル	Pediarix
	小脳性運動失調	バクタ
	けいれん/発作	ActHIB、Adacel、Afluria、Boostrix、Daptacel、DT、Fluarix、Fluvalal、Fluzone、Havrix、Hiberix、IPOL、Kinrix、MMR-II、Quadracel、Recombivax、Tdvax、Twinrix、Varivax
	意識レベルの低下	Boostrix、Pediarix、Pentacel
		Fluarix、Fluvalal、Fluzone、Havrix、MMR-II、ProQuad、Tdvax、Tenivac、Varivax
	脳炎、ワクチン誘発 脳炎[ <i>脳の炎症</i> ]	Boostrix、Engerix-B、FluMist、MMR-II、Pediarix、Recombivax、Twinrix、Vaqta、Varivax
	脳脊髄炎[脳と脊髄]	Afluria、Fluarix、Fluzone
	脳症[ <i>脳疾患</i> ]	Afluria、Engerix-B、Fluvalal、Havrix、Infanrix、MMR-II、ProQuad、Twinrix
	顔面神経麻痺、ベル麻痺	Adacel、Boostrix、Engerix-B、Fluarix、FluMist、Fluzone、ProQuad、Recombivax、Twinrix、Varivax
	顔面 ( または頭蓋 ) 神経麻痺	フララバル
	顔面不全麻痺[ <i>顔の動きの障害</i> ]Fluarix	
	熱性けいれん/発作	Afluria、Daptacel、Fluzone、IPOL、MMR-II、PedvaxHIB、Pneumovax-23、ProQuad、Quadracel、Recombivax
	ギランバレー症候群*	Adacel、Afluria、Engerix-B、Fluarix、Fluvalal、FluMist、Fluzone、Havrix、MMR-II、PedvaxHIB、Pneumovax-23、ProQuad、Recombivax、Tenivac、Vaqta、Varivax
	頭痛	DT、Infanrix、IPOL、MMR-II、ProQuad、Tdvax、Twinrix
	知覚異常[ <i>減少した触覚感度</i> ]	Adacel、Engerix-B、Fluarix、Fluvalal、Havrix、Recombivax、Twinrix
	運動低下[ <i>筋運動の喪失</i> ]	フララバル
	低張性低反応性エピソード 予防接種 ( HHE )	Daptacel、Hiberix、Kinrix、Pediarix、Pentacel、Quadracel
	無気力	Pediarix
	肢麻痺	フララバル
	麻疹封入体脳炎片頭痛	MMR-II、ProQuad
		Engerix-B、Recombivax
	多発性硬化症 ( またはMS悪化 ) *	Engerix-B、Havrix、Recombivax、Twinrix
	脊髄炎[ <i>脊髄疾患</i> ]	Adacel、Fluarix、Fluzone、Havrix、Recombivax、Twinrix Afluria
	神経痛[ <i>神経痛</i> ]	
	神経炎 ( 上腕、多発神経炎を含む )	Adacel、Afluria、Engerix-B、Fluarix、Fluzone、MMR-II、Twinrix
	神経障害、多発神経障害	Afluria、Engerix-B、Fluarix、Havrix、MMR-II、ProQuad、Recombivax、Twinrix

	眼性麻痺* [ 神経損傷]	MMR-II、ProQuad
	視神経炎/神経障害、乳頭炎* [ 視神経の炎症]	Engerix-B、Fluzone、MMR-II、ProQuad、Recombivax、Twinrix
	麻痺	Engerix-B、Twinrix
	麻痺[ 部分的麻痺]	Engerix-B、Twinrix
	感覚異常[ 異常な皮膚感覚]	Adacel、Afluria、Boostrix、Engerix-B、Fluarix、Flucelvax、Fluvalal、Fluzone、Havrix、IPOL、MMR-II、Pneumovax-23、ProQuad、Tenivac、Varivax
	部分発作、発作	Daptacel、Engerix-B、ProQuad
	失神[ かすかな感じ]	フルセルバックス
	神経根障害[ 脊椎の「挟まれた神経」]	Pneumovax-23、Recombivax
	傾眠	Daptacel、DT、Fluulaval、Havrix、Hiberix、IPOL、Pediarix、Pentacel、Quadracel、Recombivax
	亜急性硬化性全脳炎	MMR-II、ProQuad
	失神、血管迷走神経性失神[ 失神]	Adacel、Bexero、Boostrix、Daptacel、DT、Engerix-B、Fluarix、Flucelvax、Fluvalal、Fluzone、Havrix、Hiberix、Infanrix、Kinrix、MMR-II、Pediarix、ProQuad、Recombivax、Tenivac、Trumenba
	横断性骨髄炎	Afluria、Engerix-B、Fluzone、MMR-II、ProQuad、Recombivax、Twinrix、Varivax
	振戦	Flulaval、ProQuad
精神医学 ( 8 )	攪拌	IPOL、ProQuad、Recombivax
	泣く/異常な泣き	Pediarix
	過眠症	ブロクアット
	不眠症	フルラバル、ベディアリックス
	苛立ち	MMR-II、Recombivax
	緊張感	Pediarix、ProQuad
	落ち着きのなさ	Pediarix
	叫ぶ	ダブタセル、ベディアリックス、ペンタセル、クアドラセル
呼吸器、胸部 および縦隔 ( 12 ) 無呼吸		Engerix-B、Hiberix、Infanrix、Kinrix、Pediarix、Pentacel、Prevnam-13
	喘息、喘息のような症状	Engerix-B、Fluarix、Twinrix
	気管支けいれん	Engerix-B、Fluarix、Fluulaval、MMR-II、ProQuad、Recombivax、Tenivac、Twinrix
	咳	Fluarix、Fluzone、Infanrix、MMR-II、Pediarix、Pentacel
	チアノーゼ* [ 青みがかった変色、低酸素]	Daptacel、Hiberix、Infanrix、Pediarix、Pentacel、Prevnam-13、Quadracel
	呼吸困難[ 呼吸困難]	Fluarix、Fluulaval、Fluzone、Havrix、Pediarix、Quadracel、Twinrix、Flulaval
	発声障害[ 声の異常]	
	中咽頭痛	フルゾン
	呼吸困難	Fluarix
	鼻漏[ 鼻水]	フルゾン
	ストライド[ 甲高い喘鳴]	Fluarix
	喉の圧迫感	フルラバル、フルゾン
	喘鳴	Fluzone、ProQuad
皮膚/皮下 ティッシュ ( 22 )	乳児期の急性出血性浮腫	MMR-II、ProQuad
	脱毛症[ 脱毛]	Engerix-B、Recombivax、Twinrix

	斑状出血[皮下出血]	Engerix-B、Recombivax、Twinrix
	湿疹	Engerix-B、Recombivax、Twinrix
	紅斑[皮膚の発赤]	Fluarix、Infanrix、MMR-II、Pediarix、Pentacel、Tdvax
	多形性紅斑[皮膚障害]	Engerix-B、Fluarix、Havrix、MMR-II、Pneumovax-23、ProQuad、Prev- nar-13、Recombivax、Twinrix、Varivax
	結節性紅斑[結節またはしこり]	Engerix-B、Recombivax、Twinrix
	Exanthem [広範な発疹]	ブーストリックス
	顔の腫れ/浮腫	Daptacel、Fluarix、MMR-II、ProQuad、Varivax Flulaval、Ha
	過剰加水分解[異常発汗]	vrix、Twinrix
	とびひ	ProQuad、Varivax
	扁平苔癬[炎症性皮膚発疹]	Engerix-B、Twinrix
	脂肪織炎[皮膚の脂肪層の病気]	MMR-II、ProQuad
	耳下炎[唾液腺の炎症]	MMR-II、ProQuad
	そう痒症[皮膚のかゆみ]	ActHIB、Adacel、Afluria、Boostrix、Daptacel、Fluarix、Flucelvax、Flu- lal、Fluzone、Infanrix、Kinrix、MMR-II、Prev- nar-13、ProQuad、Tdvax、 Tenivac
	ブルプラ[赤/紫の斑点]	Engerix-B、MMR-II、ProQuad
	発疹	ActHIB、Adacel、Afluria、Bexero、Boostrix、Daptacel、DT、Fluarix、Flucelvax、 Flulaval、FluMist、Fluzone、Hiberix、Infanrix、IPOL、MMR-II、Pediarix、Pentace l、Pneumovax-23、Prev- nar-13、Quadracel、Tdvax デニバック
	皮膚の変色	ペンタセル
	皮膚硬化	MMR-II、ProQuad
	ステイーブンス・ジョンソン症候群[重度 皮膚反応]	Engerix-B、Fluarix、Fluzone、MMR-II、ProQuad、Recombivax、Varivax
	じんましん*[じんましん]	ActHIB、Adacel、Afluria、Boostrix、DT、Engerix-B、Fluarix、Flucelvax、Flu- lal、Fluzone、Hiberix、Infanrix、IPOL、Kinrix、MMR-II、Pediarix、Pentacel、Pneum ovax-23、Prev- nar-13、Quadracel、Recombivax、RotaTeq、Tenivac、Twinrix
	発泡	MMR-II
血管 ( 8 )	脳血管障害	ProQuad、Varivax
	フラッシング	フルラバル、フルゾン
	ヘノッホ・シェーンライン紫斑病[血液 血管の炎症]	Boostrix、Fluarix、MMR-II、ProQuad、Varivax
	蒼臭	DT、Flulaval、Hiberix、Pediarix、Pentacel、Prev- nar-13、Quadracel Pediarix、Reco
	点状出血[出血毛細血管]	mbivax
	結節性多発動脈炎[損傷した動脈]	Recombivax
	腎血管炎	アフルリア
	血管炎	Afluria、Engerix-B、Fluarix、Fluzone、Havrix、MMR-II、Recombivax、 Twinrix
泌尿生殖器 ( 2 )	精巣上体炎[精巣炎症]	MMR-II、ProQuad
	精巣炎[精巣の炎症]	MMR-II、ProQuad

\*表2に示す情報についていくつか注意する点があります。最初に、各障害に逐語的挿入の用語を使用し、また、添付文書の疾患の分類にもほとんどこだわってしまし  
たが、アレルギー性疾患と自己免疫疾患の2つのカテゴリを追加しました。インサートは驚くほど省略されていること。(パッケージには、「免疫系障害」と一緒に  
一括アレルギー反応が挿入されています。)次に、複数のカテゴリに当てはまる障害がいくつかあります。それらの例では、それらを(アスタリスク\*を付けて)  
両方の場所に含めました(それらを1回カウントしている間)。第3に、表には製造元が挿入物で報告することを決定した有害事象のみが含まれていますが、他の有害  
事象は可能性があるだけでなく、おそらく、過少報告の広範な問題が原因です。特筆すべきは、添付文書のいずれにも、流行に関する記述は含まれていません。